

Nachsorgeschema Malignes Melanom

Untersuchungsintervalle/Jahr		klinische Untersuchung	regionäre LK-Sonographie	CT-Hals/-Thorax/-Abdomen	MRT-Kopf	S-100
in situ Melanome (pTis)	1. J	2x	-	-	-	-
	2.-10. J	1x	-	-	-	-
Stadium Ia	1.-5. J	2x	-	-	-	-
	6.-10. J	1x	-	-	-	-
Stadium Ib	1.-5. J	2x	1x	-	-	-
	6.-10. J	2x	-	-	-	-
Stadium IIa/IIb	1.-5. J	4x	2x	(nach 1., 3. und 5. Jahr)*	(nach 1., 3. und 5. Jahr)	4x
	6.-10. J	2x	1x	-	-	-
Stadium IIc, III	1.-5. J	4x	4x	2x	2x	4x
	6.-10. J	2x	2x	1x (nicht Stadium IIIa)	1x (nicht Stadium IIIa)	2x
Stadium IV	1.-10. J	individuell	individuell	individuell	individuell	individuell

- CT-Hals im Stadium II nur bei Malignem Melanom im Kopf-, Hals- oder Thoraxbereich
- Bei Melanoma in situ und Stadium Ia: Nachsorge beim Niedergelassenen Hautarzt empfohlen
- Malignes Melanom Stadium Ib/II: Alternierende Nachsorge zwischen Klinik und Niedergelassenem Hautarzt empfohlen

Nachsorgeschema Malignes Melanom	Verteiler: Hautklinik-Intranet	Version 3
Gez. Loquai, 16.12.2010	Gez. Loquai, 16.12.2010	Gez. Loquai, 16.12.2010 / Gez. Grabbe 20.12.2010
Erstellt: Dr. C. Loquai, Datum	Geprüft: Dr. C. Loquai, Datum	Freigegeben: Dr. C. Loquai, Datum / Prof. Dr. S. Grabbe, Datum